Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

GJELDENDE GRENSEVERDIER FOR ALGETOKSINER I SKJELL TIL OMSETNING

Vannløselige toksiner inkluderer:
STX-gruppen (PSP) og DA-gruppen (ASP).

Toksiner	Administrativ grenseverdi, µg/kg skjellmat	Vurdering
STX-gruppen (PSP)	800 STXdiHCl-ekv.	Høstingsforbud
STX-gruppen (PSP)	400-800 STXdiHCl-ekv.	Kan høste ***kort*** tid
DA-gruppen (ASP)	20 000 DA-ekv.	Høstingsforbud

Fettløselige toksiner inkluderer:
OA-, YTX-, PTX- og AZA-gruppe.

Toksiner	Administrativ grenseverdi, µg/kg skjellmat	Vurdering
OA-gruppen	160 OA-ekv.	Høstingsforbud
YTX-gruppen	3750 YTX-ekv.	Høstingsforbud
PTX-gruppen	160 som OA-ekv.	Høstingsforbud
AZA-gruppen	160 AZA-ekv.	Høstingsforbud

GRENSEVERDIER FOR KOSTHOLDSRÅD BASERT PÅ KJEMISK ANALYSE

Toksiner	Administrativ grenseverdi, µg/kg skjellmat	Kommentar	Vurdering
STX-gruppen (PSP)	400 STXdiHCl-ekv.		Spising frarådes
DA-gruppen (ASP)	20 000 DA-ekv.		Spising frarådes
OA-gruppen (DSP)	160 OA-ekv.		Spising frarådes
YTX-gruppen	3750 YTX-ekv.		Spising frarådes
PTX-gruppen	160 som OA-ekv.		Spising frarådes
AZA-gruppen (AZP)	160 AZA-ekv.		Spising frarådes

Leveringsadresse:
NMBU – Campus Adamsstuen, MatInf, mattrygghet
Marine Algetoksiner, Bygg 15
Ullevålsveien 72, 0454 Oslo.

Skjema oppdatert:
07.06.2018